

wiskunde B

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Aanleveren scores
- 6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VO.

Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.

Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
- 2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijd aan de directeur van de school van de gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

- 3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde.
- 4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:

- 1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
 - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
 - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
 - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
 - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
 - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
 - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

- 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
 - 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
 - 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.
- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
 - 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
 - 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
 - 7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
 - 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
 - 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 *T.a.v. de status van het correctievoorschrift:*

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.

Verduidelijking

Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.

Een fout

Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.

Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

- Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
- Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten moeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

- 1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.
- 2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische rekenmachine gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt.
- 3a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden.
- 3b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat tussenantwoorden moeten worden afgerond.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Zuigflesje

1 maximumscore 4

- $d(x) = 0,04x^2 - 0,56x + 6$ 1
- $d'(x) = 0,08x - 0,56$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $d'(x) = 0$ algebraïsch opgelost kan worden 1
- (Dus de verticale afstand d is het kleinst voor) $x = 7$ 1
of
 - $d(x) = 0,04x^2 - 0,56x + 6$ 1
 - De gevraagde waarde van x is $-\frac{-0,56}{2 \cdot 0,04}$ 2
 - (Dus de verticale afstand d is het kleinst voor) $x = 7$ 1

Opmerking

In het tweede antwoordalternatief voor het tweede antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

2 maximumscore 3

- Er geldt $h(x) = \frac{f(x) + g(x)}{2}$ 1
- Ingevuld wordt dit $h(x) = \frac{-0,02x^3 + 0,36x^2 - 1,56x + 6,88}{2}$ 1
- Dit geeft $h(x) = -0,01x^3 + 0,18x^2 - 0,78x + 3,44$ 1

Hyperbool met cirkels

3 maximumscore 4

- $f'(x) = \frac{12}{(2x-3)^2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- $f'(3) = \frac{4}{3}$ 1
- $f'(0) = \frac{4}{3}$ 1

Opmerking

Voor het eerste antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

4 maximumscore 6

- ($rc_n \cdot \frac{4}{3} = -1$ met n de lijn door A loodrecht op m dus) $rc_n = -\frac{3}{4}$ (dus n heeft een vergelijking van de vorm $y = -\frac{3}{4}x + b$) 1
- Invullen van de coördinaten van $A(3, 0)$ in $y = -\frac{3}{4}x + b$ geeft $b = \frac{9}{4}$ (dus een vergelijking van n is $y = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{4}$) 1
- Een vergelijking van m is $y = \frac{4}{3}x + 4$ 1
- Uit $\frac{4}{3}x + 4 = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{4}$ volgt $x = -\frac{21}{25}$ 1
- $x = -\frac{21}{25}$ invullen in $y = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{4}$ (of in $y = \frac{4}{3}x + 4$) geeft $y = \frac{72}{25}$ 1
- Het midden tussen $A(3, 0)$ en $(-\frac{21}{25}, \frac{72}{25})$ is $\left(\frac{3 + -\frac{21}{25}}{2}, \frac{0 + \frac{72}{25}}{2}\right)$ (en dit is inderdaad M_1) 1

5 maximumscore 3

- $x^2 + y^2 - 3x - 4y = 0$ geeft $(x - \frac{3}{2})^2 - \frac{9}{4} + (y - 2)^2 - 4 = 0$ (dus c_2 heeft een vergelijking van de vorm $(x - \frac{3}{2})^2 + (y - 2)^2 = r^2$) 1
- De coördinaten van het middelpunt van c_2 zijn dus $(\frac{3}{2}, 2)$ 1
- $\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} = 2$ (dus het middelpunt van c_2 ligt op k) 1

Het rendement van warmtemotoren

6 maximumscore 3

- Als R groter wordt, wordt $100-R$ kleiner 1
- Omdat de teller groter wordt en de noemer kleiner, wordt de breuk $\frac{R}{100-R}$ groter 1
- (Het grondtal van de logaritme is groter dan 1) dus $\log\left(\frac{R}{100-R}\right)$ neemt toe (dus K neemt toe) 1

7 maximumscore 4

- In de figuur bij de stip Charles Parsons op de verticale as $-0,5$ aflezen 1
- De vergelijking $-0,5 = \log\left(\frac{R}{100-R}\right)$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Het rendement van de warmtemotor van Charles Parsons is 24 (%) 1

Opmerking

Als een kandidaat voor K een andere waarde heeft afgelezen tussen $-0,55$ en $-0,45$, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

8 maximumscore 4

- Als $R = 70$ dan is $K = \log\left(\frac{70}{100-70}\right)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\log\left(\frac{70}{100-70}\right) = 0,00667t - 2$ opgelost kan worden 1
- $t = 355,01\dots$ 1
- Dus in het jaar 2056 zal voor het eerst een rendement van 70% behaald worden 1

Opmerking

Het antwoord 2055 ook goed rekenen.

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

9 maximumscore 5

- (Formules (1) en (2) combineren geeft) $\log\left(\frac{R}{100-R}\right)=0,00667t-2$ 1
- Hieruit volgt $\frac{R}{100-R}=10^{0,00667t-2}$ 1
- Dit geeft $R=(100-R)\cdot10^{0,00667t-2}$ 1
- Dus $(1+10^{0,00667t-2})R=100\cdot10^{0,00667t-2}$ 1
- Hieruit volgt $R=100\cdot\frac{10^{0,00667t-2}}{1+10^{0,00667t-2}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

Cosinus en lijnen

10 maximumscore 4

- De vergelijking $2\cos(3x)=\sqrt{3}$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $\cos(3x)=\frac{1}{2}\sqrt{3}$ waaruit volgt $3x=\frac{1}{6}\pi (+k\cdot2\pi)$ 1
(of $3x=-\frac{1}{6}\pi (+k\cdot2\pi)$) 1
- Dus voor de x -coördinaat van A geldt $x=\frac{1}{18}\pi$ 1
- De richtingscoëfficiënt van k is $\frac{\sqrt{3}}{\frac{1}{18}\pi}=\frac{18\sqrt{3}}{\pi}$ 1

11 maximumscore 7

- De tangens van de hoek die k maakt met de x -as is $\frac{18\sqrt{3}}{\pi}$ 1
- De hoek die k maakt met de x -as is $84,24\dots^\circ$ 1
- (De periode van f is $\frac{2}{3}\pi$ dus) de x -coördinaat van T is $\frac{2}{3}\pi$ 1
- (De amplitude van de grafiek van f is 2 dus) de y -coördinaat van T is 2 1
- De richtingscoëfficiënt van l is $\frac{2}{\frac{2}{3}\pi}$ 1
- De hoek die l maakt met de x -as is $43,67\dots^\circ$ 1
- Dan is de gevraagde hoek $(84,24\dots^\circ - 43,67\dots^\circ = 40,56\dots^\circ$, dit is afgerond op hele graden) 41° 1

Wortelfunctie

12 maximumscore 4

- De coördinaten van M zijn $(\frac{1}{2}, 1)$ 1
- Er geldt $g(x) = a \cdot f(x) = a\sqrt{x}$ 1
- $a\sqrt{\frac{1}{2}} = 1$ 1
- Hieruit volgt $a = \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking), dus de y -coördinaat van N is $(\sqrt{2} \cdot 1 =) \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- De coördinaten van M zijn $(\frac{1}{2}, 1)$ 1
- Er geldt $g(x) = f(a \cdot x) = \sqrt{a \cdot x}$ 1
- $a = \frac{1}{\frac{1}{2}} (= 2)$ 1
- Dus de y -coördinaat van N is $(\sqrt{2 \cdot 1} =) \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

13 maximumscore 4

- $OA = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 1
- $AB = (\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} =) \sqrt{(b-1)^2 + (\sqrt{b}-1)^2}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\sqrt{(b-1)^2 + (\sqrt{b}-1)^2} = \sqrt{2}$ opgelost kan worden 1
- Het gevraagde antwoord is 2,31 1

Brug

14 maximumscore 7

- P en Q invullen in de formule geeft het stelsel

$$\begin{cases} 0 = 1,4 + b + \frac{c}{1,4} \\ 0 = 12,0 + b + \frac{c}{12,0} \end{cases} \quad 1$$

- Hieruit volgt $1,4 + \frac{c}{1,4} = 12,0 + \frac{c}{12,0}$ 1

- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1

- Dit geeft $c = 16,8$ 1

- Hieruit volgt $b = -13,4$ 1

- Het punt $T(4,1; 2,4)$ invullen in $y = a\left(x - 13,4 + \frac{16,8}{x}\right)$ geeft 1

$$2,4 = a\left(4,1 - 13,4 + \frac{16,8}{4,1}\right) \quad 1$$

- (Hieruit volgt $a = -0,46\dots$) dus de gevraagde waarde van a is $-0,5$ 1

of

- $\frac{dy}{dx} = a - \frac{ac}{x^2}$ 1

- $\frac{dy}{dx} = 0$ geeft $x = \sqrt{c}$ 1

- (Omdat het hoogste punt T is, volgt $\sqrt{c} = 4,1$ dus $c = 16,81$, dus) de gevraagde waarde van c is $16,8$ 1

- P invullen in de formule geeft $a\left(1,4 + b + \frac{16,81}{1,4}\right) = 0$ 1

- ($b = -13,40\dots$) dus de gevraagde waarde van b is $-13,4$ 1

- Het punt $T(4,1; 2,4)$ invullen geeft $2,4 = a\left(4,1 - 13,40\dots + \frac{16,81}{4,1}\right)$ 1

- (Hieruit volgt $a = -0,46\dots$) dus de gevraagde waarde van a is $-0,5$ 1

of

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

- $\frac{dy}{dx} = a - \frac{ac}{x^2}$ 1
- $\frac{dy}{dx} = 0$ geeft $x = \sqrt{c}$ 1
- (Omdat het hoogste punt T is, volgt $\sqrt{c} = 4,1$ dus $c = 16,81$, dus) de gevraagde waarde van c is 16,8 1
- Q invullen in de formule geeft $a\left(12,0 + b + \frac{16,81}{12,0}\right) = 0$ 1
- ($b = -13,40\dots$) dus de gevraagde waarde van b is $-13,4$ 1
- Het punt $T(4,1; 2,4)$ invullen geeft $2,4 = a\left(4,1 - 13,40\dots + \frac{16,81}{4,1}\right)$ 1
- (Hieruit volgt $a = -0,46\dots$) dus de gevraagde waarde van a is $-0,5$ 1

Ingeschreven cirkel

15 maximumscore 3

- Er geldt $G = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot r + \frac{1}{2} \cdot BC \cdot r + \frac{1}{2} \cdot AC \cdot r$ 1
- $P = AB + BC + AC$ 1
- $G = \frac{1}{2} \cdot (AB + BC + AC) \cdot r$ (dus $G = \frac{1}{2} \cdot P \cdot r$) 1

16 maximumscore 6

- Er geldt $13^2 = 14^2 + 15^2 - 2 \cdot 14 \cdot 15 \cdot \cos(\angle A)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Dit geeft $\angle A = 53,13\dots^\circ$ 1
- De oppervlakte van driehoek ABC is $\frac{1}{2} \cdot 14 \cdot \sin(\angle A) \cdot 15$ 1
- Dit geeft $G = 84$ (of $G \approx 84$) 1
- Hieruit volgt $r = \frac{2G}{P} = \frac{2 \cdot 84}{13 + 14 + 15} = 4$ 1

Exponentiële functie

17 maximumscore 4

- $f(a) = 16$ geeft $\frac{1}{9} \cdot (3^{-\frac{1}{2}a} + 27) = 16$ 1
- Hieruit volgt $3^{-\frac{1}{2}a} = 117$ 1
- Dit geeft $-\frac{1}{2}a = {}^3 \log(117)$ 1
- Dus $a = -2 \cdot {}^3 \log(117)$ (of een gelijkwaardige uitkomst) 1

Opmerking

Als een kandidaat rekent met $f(a) = 4$, voor deze vraag ten hoogste 1 scorepunt toekennen.

18 maximumscore 5

- $f(x) = (\frac{1}{9} \cdot (3^{-\frac{1}{2}x} + 27)) = \frac{1}{9} \cdot 3^{-\frac{1}{2}x} + 3$ 1
- Dus $f(x) = 3^{-2} \cdot 3^{-\frac{1}{2}x} + 3$ 1
- Dit geeft $f(x) = 3^{-\frac{1}{2}x-2} + 3$ 1
- Hieruit volgt $f(x) = (3^{-\frac{1}{2}})^{x+4} + 3$ 1
- Dit geeft $f(x) = \left(\frac{1}{3^{\frac{1}{2}}}\right)^{x+4} + 3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{x+4} + 3$ 1

of

- $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{x+4} + 3 = \left(\frac{1}{3^{\frac{1}{2}}}\right)^{x+4} + 3$ 1
- $\left(\frac{1}{3^{\frac{1}{2}}}\right)^{x+4} + 3 = (3^{-\frac{1}{2}})^{x+4} + 3$ 1
- $(3^{-\frac{1}{2}})^{x+4} + 3 = 3^{-\frac{1}{2}x-2} + 3$ 1
- $3^{-\frac{1}{2}x-2} + 3 = 3^{-2} \cdot 3^{-\frac{1}{2}x} + 3$ 1
- $3^{-2} \cdot 3^{-\frac{1}{2}x} + 3 = \frac{1}{9} \cdot 3^{-\frac{1}{2}x} + 3 = \frac{1}{9} \cdot (3^{-\frac{1}{2}x} + 27)$ 1

Opmerking

Als zowel $\frac{1}{9} \cdot (3^{-\frac{1}{2}x} + 27)$ als $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{x+4} + 3$ herschreven worden, waarbij de kandidaat twee keer op dezelfde uitdrukking uitkomt, bijvoorbeeld $3^{-\frac{1}{2}x-2} + 3$, hiervoor uiteraard geen scorepunten in mindering brengen.

5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf.
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 11 juli.

6 Bronvermeldingen

Zuigflesje

foto bron: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2022

Brug

foto bron: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2022