

**uitwerkbijlage**

Naam kandidaat \_\_\_\_\_

Kandidaatnummer \_\_\_\_\_

**3**

letter	naam


**5**

	hoger dan in de rechter- longader	lager dan in de rechter- longader
Het zuurstofgehalte in de linkerlongader is ...		
Het koolstofdioxidegehalte in de linkerlongader is ...		

**8**

	juist	onjuist
De placenta ontstaat voordat de bevruchte eicel innestelt.		
De placenta ontstaat in de vagina.		

19



21

	antigen	antistof
functie aangepast ebolavirus		
functie stoffen in het bloed na vaccinatie		

25

vader		
moeder		

Het bloed kan

- wel
  - niet
- van Lodewijk de zestiende zijn, omdat
- .....
- .....
- .....

43

	<b>de onbevruchte eicel</b>	<b>de zaadcel</b>
Chromosoom W was aanwezig in ...		
Chromosoom Z was aanwezig in ...		

49

	<b>donor</b>	<b>ontvanger</b>
De antigenen zijn van de ...		
De antistoffen zijn van de ...		

52

	<b>juist</b>	<b>onjuist</b>
Oogwormen zijn meer verwant aan geleedpotigen dan aan ringwormen.		
Oogwormen zijn later ontstaan dan sponzen.		

55

	<b>juist</b>	<b>onjuist</b>
Met zo'n piramide kan de biomassa of het aantal organismen weergegeven worden.		
De zeearenden zijn aangeduid met nummer 4.		
In deze piramide zijn reducenten weergegeven.		

**VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN**